



DENTOKIND, tablete, 15 mg + 15 mg + 15 mg + 15 mg

INN: Belladonna trit. D6, Chamomilla trit. D6, Ferrum phosphoricum trit. D6, Hepar sulfuris trit. D12, Pulsatilla trit. D6

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek DENTOKIND, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle nekoliko dana, morate se obratiti svom lekaru.
- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek DENTOKIND i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek DENTOKIND
3. Kako se upotrebljava lek DENTOKIND
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek DENTOKIND
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LEK DENTOKIND I ČEMU JE NAMENJEN

DENTOKIND je homeopatski lek namenjen olakšavanju tegoba nastalih u toku nicanja zuba kao što su iritiranost, povišena temperatura, dijareja i bol u uhu kod beba i dece.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DENTOKIND

Lek DENTOKIND ne smete koristiti:

Nisu poznata stanja kada se DENTOKIND ne sme koristiti ili kada treba biti naročito oprezan.

Kada uzimate lek DENTOKIND, posebno vodite računa:

Ukoliko primetite da Vaše dete slabo reaguje na terapiju ili dođe do pojave neočekivanih reakcija, obratite se Vašem lekaru. U slučaju recidiva ili pogoršanja stanja obratite se Vašem lekaru ili lekaru homeopati.

Primena drugih lekova

Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima. Kažite lekaru ili farmaceutu ako Vaše dete uzima ili je do nedavno uzimalo bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Uzimanje leka DENTOKIND sa hranom ili pićima

Lek DENTOKIND treba uzimati pola sata pre ili posle jela.

Primena leka DENTOKIND u periodu trudnoće i dojenja

Nije primenljivo. Lek je namenjen deci.

Uticaj leka DENTOKIND na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nije primenljivo. Lek je namenjen deci.

Važne informacije o nekim sastojcima leka DENTOKIND

U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka, jer se u njegovom sastavu nalazi laktosa.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DENTOKIND

Deca od 0 do 1 godine: Kod akutnih tegoba dati po 1 tabletu na svaki sat, maksimum 6 tableta u toku dana. Nakon poboljšanja stanja, dati 1 tabletu 3 puta na dan.

Deca od 1 do 6 godina: Kod akutnih tegoba dati 2 tablete na svaki sat, maksimalno 12 tableta u toku dana. Nakon poboljšanja stanja, dati 2 tablete 3 puta dnevno.

Preporučuje se da se tableta uzme pola sata pre ili posle jela i pustiti da se polako rastopi u ustima.

Kod beba se preporučuje da se tableta pre davanja rastvori u malo vode. Ako ne dođe do poboljšanja ili se tegobe učestalo ponavljaju, pacijent treba da se obrati svom lekaru.

Ako ste uzeli više leka DENTOKIND nego što je trebalo

Do sada nisu zabeleženi slučajevi ozbiljnog predoziranja ovim lekom. Ukoliko se Vaše dete ne oseća dobro javite se Vašem lekaru.

Ako ste zaboravili da uzmete lek DENTOKIND

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

Ako naglo prestanete da uzimate lek DENTOKIND

Ukoliko naglo prestanete sa uzimanjem ovog leka ne očekuju se nikakvi negativni efekti.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Nema poznatih neželjenih dejstava izazvanih upotrebom leka DENTOKIND. Ukoliko posumnjate da Vaše dete ima neželjene posledice nakon primene leka DENTOKIND, javite se Vašem lekaru ili lekaru homeopati.

5. KAKO ČUVATI LEK DENTOKIND

Rok upotrebe

5 godina

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja boćice: 12 meseci.

Čuvanje

Čuvati na temperaturi do 25 °C u originalnom pakovanju.

Čuvati van domaćaja i vidokruga dece!

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek DENTOKIND

1 tableta sadrži: Belladonna trit. D6 15 mg, Chamomilla trit. D6 15 mg, Ferrum phosphoricum trit. D6 15 mg, Hepar sulfuris trit. D12 15 mg, Pulsatilla trit. D6 15 mg.

Pomoćne supstance: celuloza, mikrokristalna; talk; laktosa, monohidrat; magnezijum-stearat.

Kako izgleda lek DENTOKIND i sadržaj pakovanja

Okrugle, ravne, fasetirane tablete bele boje.

U kutiji se nalazi bočica od tamnog stakla tipa III, sa HD-PE zatvaračem na navoj bele boje, sadrži 150 tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Alpen Pharma d.o.o.

Ilirska 5

11060 Beograd

Srbija

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostrasse 24
76227 Karlsruhe
Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust 2009

Režim izdavanja leka

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole

3247/2010/12 od 04.06.2010

