



Za lekove koji se izdaju bez lekarskog recepta:

Ovo je homeopatski lek

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za lečenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg lekara. Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete poželeti da ga ponovo pročitate.

Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savet, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle nekoliko dana, obavezno posetite Vašeg lekara!

Zaštićen naziv leka, jačina leka, farmaceutski oblik:

**KINDINORM, 0,0167 g + 0,0167 g
+ 0,0167 g + 0,0167 g + 0,0167 g
+ 0,0167 g, granule**

INN: Calcium hypophosphoricum dil. D4, Chamomilla dil. D12, Cuprum metallicum dil. D10, Kalium phosphoricum dil. D6, Staphisagria dil. D12, Valeriana dil. D6

Sadržaj aktivnih supstanci: 10 g granula sadrži: Calcium hypophosphoricum dil. D4 0,0167 g, Chamomilla dil. D12 0,0167 g, Cuprum metallicum dil. D10 0,0167 g, Kalium phosphoricum dil. D6 0,0167 g, Staphisagria dil. D12 0,0167 g, Valeriana dil. D6 0,0167 g

Sadržaj pomoćnih supstanci: saharoza

Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:

Alpen Pharma d.o.o.

Ilirska 5

11060 Beograd

Srbija

Naziv i adresa proizvođača:

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostrasse 24
76227 Karlsruhe
Nemačka

1. ŠTA JE LEK KINDINORM I ČEMU JE NAMENJEN?

KINDINORM je homeopatski lek namenjen tretmanu poremećaja ponašanja naročito kod dece koja imaju problem održavanja pažnje i koncentracije, nervozna su, iritirana, uznemirena, imaju poteškoće sa učenjem, poremećaj sna, ili stanja opšte slabosti.

SASTAV

10 g granula sadrži: Calcium hypophosphoricum dil. D4 0,0167 g, Chamomilla dil. D12 0,0167 g, Cuprum metallicum dil. D10 0,0167 g, Kalium phosphoricum dil. D6 0,0167 g, Staphisagria dil. D12 0,0167 g, Valeriana dil. D6 0,0167 g

Farmaceutski oblik i sadržaj: granule, 10 g

PAKOVANJE

Staklena bočica, sadrži 10 g granula

Broj rešenja 4938/2009/12 od 21.09.2009

2. ŠTA MORATE DA PROČITATE PRE UPOTREBE LEKA

Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

KADA NE SMETE UZIMATI LEK

Nisu poznata ograničenja u korišćenju leka KINDINORM.

UPOZORENJA I MERE OPREZA

Konsultujte se sa lekarom ako problematično stanje traje dugo, nejasno je ili novo, pošto je moguće da se radi o stanju koje zahteva medicinsko objašnjenje.

Decu ispod 6 godina treba, pre upotrebe leka KINDINORM, da pregleda lekar radi određivanja dijagnoze i prepisivanja adekvatne terapije.

UZIMANJE LEKA KINDINORM SA HRANOM ILI PIĆIMA

Nema poznatih interakcija do sada.

PRIMENA U TRUDNOĆI I DOJENJU

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

U trudnoći i tokom laktacije konsultovati lekara obučenog za primenu homeopatskih lekova i preparata.

UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI PRILIKOM UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM I MAŠINAMA

Efekti leka KINDINORM na upravljanje motornim vozilima i mašinama su zanemarljivi.

NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUGE LEKOVE

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

3. KAKO SE LEK KINDINORM UPOTREBLJAVA

Ukoliko mislite da lek KINDINORM suviše slabo ili jako deluje na organizam Vašeg deteta, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Ukoliko nije drugačije prepisano

Odrasli i deca starija od 12 godina: 5–10 granula, 3 x dnevno

Deca od 6 do 12 godina: 3–5 granula, 3 x dnevno

Deca do 6 godina: 2–3 granule, 3 x dnevno

Uzeti granule pola sata pre ili posle jela i pustiti ih da se polako rastope u ustima.

KINDINORM bi trebalo koristiti duži vremenski period (npr. 6 do 8 nedelja), nakon konsultacije sa lekarom.

UKOLIKO STE UZELI VIŠE LEKA NEGO ŠTO BI TREBALO

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka KINDINORM nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

Ne očekuju se nikakvi neželjeni efekti iako je uzeto više granula nego što bi trebalo.

UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LEK KINDINORM

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

ŠTA SE DEŠAVA AKO NAGLO PRESTANETE DA UZIMATE LEK KINDINORM

Nema nikakvih efekata.

4. NEŽELJENA DEJSTVA LEKA

Do sada nema poznatih neželjenih dejstava.

5. ČUVANJE I ROK UPOTREBE

ČUVANJE

Držati lek KINDINORM van domašaja dece!

Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C.

Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE

4 godine

NAČIN IZDAVANJA LEKA

Bez lekarskog recepta

POSEBNA MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

DATUM POSLEDNJE REVIZIJE TEKSTA UPUTSTVA

Septembar 2009