



GASTROKIND, 20 mg + 20 mg + 20 mg + 20 mg, tablete

INN: Arsenicum album trit. D6, Croton tiglium trit. D6, Okoubaka trit. D4, Veratum album trit. D12

Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek GASTROKIND, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle tri dana, morate se obratiti svom lekaru.
- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitćete:

1. Šta je lek GASTROKIND i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek GASTROKIND
3. Kako se upotrebljava lek GASTROKIND
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek GASTROKIND
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LEK GASTROKIND I ČEMU JE NAMENJEN

GASTROKIND je homeopatski lek namenjen bebama sa stomahnim tegobama nastalim kao posledica promene režima ishrane kao što su nadimanje i zatvor.

Takođe se koristi i kod gastrointestinalnih tegoba kod dece praćenih mučninom, povraćanjem i prolivom.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GASTROKIND

Lek GASTROKIND ne smete koristiti:

GASTROKIND ne smete uzimati ako znate da ste alergični na neku od aktivnih supstanci.

Kada uzimate lek GASTROKIND, posebno vodite računa:

Ako ne dođe do poboljšanja stanja u roku od tri dana ili se tegobe učestalo ponavljaju, obratite se Vašem lekaru. Ukoliko primetite da Vaše dete slabo reaguje na terapiju ili dođe do pojave neočekivanih reakcija, obratite se Vašem lekaru.

U slučaju recidiva ili pogoršanja stanja obratite se Vašem lekaru ili lekaru homeopati.

Primena drugih lekova

Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.

Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Uzimanje leka GASTROKIND sa hranom ili pićima

GASTROKIND tablete treba uzimati pola sata pre ili posle jela i pustiti da se lagano rastopi u ustima.

Primena leka GASTROKIND u periodu trudnoće i dojenja

Nije primenljivo. Lek je namenjen deci.

Uticaj leka GASTROKIND na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nije primenljivo. Lek je namenjen deci.

Važne informacij e o nekim sastojcima leka GASTROKIND

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GASTROKIND

Deca od 0 do 1 godine: Kod akutnih tegoba treba uzeti 1 tabletu svaki sat, najviše 6 tableta dnevno.

Nakon stabilizacije stanja, uzeti 1 tabletu 4 puta na dan.

Deca od 1 do 6 godina: Kod akutnih tegoba uzeti po 2 tablete svaki sat, najviše 12 tableta dnevno.
Nakon poboljšanja stanja uzeti po 2 tablete 4 puta dnevno.

GASTROKIND tablete treba uzimati pola sata pre ili posle jela i pustiti da se lagano rastopi u ustima.
Kod beba se preporučuje da tabletu pre davanja rastopite u malo vode.

Ako ste uzeli više leka GASTROKIND nego što je trebalo
Ne treba očekivati nikakve štetne efekte.

Ako ste zaboravili da uzmete lek GASTROKIND
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.

Ako naglo prestanete da uzimate lek GASTROKIND
Nema nikakvih efekata.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lek GASTROKIND, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Nema poznatih neželjenih dejstava izazvanih upotrebom GASTROKIND tableta.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI LEK GASTROKIND

Rok upotrebe

5 godina

Ne koristite lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

Čuvanje

Čuvati na temperaturi do 25 °C zaštićeno od svetlosti.

Čuvati van domašaja dece.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek GASTROKIND

1 tableta sadrži: Arsenicum album trit. D6 20 mg, Croton tiglium trit. D6 20 mg, Okoubaka trit. D4 20 mg, Veratrum album trit. D12 20 mg.

Pomoćne supstance: mikrokristalna celuloza, talk, magnezijum stearat.

Kako izgleda lek GASTROKIND i sadržaj pakovanja

Okrugle, ravne, fasetirane tablete bele boje.

Staklena bočica od tamnog stakla (hidrolitička grupa III) sa plastičnim zatvaračem na zavrtnj, sa 150 tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Alpen Pharma d.o.o.

Ilirska 5

11060 Beograd

Srbija

Proizvođač:

Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostrasse 24

76227 Karlsruhe

Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust 2009

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta

Broj i datum dozvole

4731/2009/12 od 14.09.2009

