



DORMIKIND, tablete, 15 mg + 20 mg + 15 mg

INN: Cypripedium pubescens D4, Magnesium carbonicum D10, Zincum valerianicum D12

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Dormikind, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle nekoliko dana, morate se obratiti svom lekaru.
- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek DORMIKIND i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek DORMIKIND
3. Kako se upotrebljava lek DORMIKIND
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek DORMIKIND
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LEK DORMIKIND I ČEMU JE NAMENJEN

DORMIKIND je homeopatski lek namenjen tretmanu uznemirenosti i nesanice kod beba i dece.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DORMIKIND

Lek DORMIKIND ne smete koristiti:

Nisu poznata stanja kada se DORMIKIND ne sme koristiti ili kada treba biti naročito oprezan.

Kada uzimate lek DORMIKIND, posebno vodite računa:

Ukoliko primetite da Vaše dete slabo reaguje na terapiju ili dodje do pojave neočekivanih reakcija, obratite se Vašem lekaru. U slučaju recidiva ili pogoršanja stanja obratite se Vašem lekaru ili lekaru homeopati.

Primena drugih lekova

Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima. Kažite lekaru ili farmaceutu ako Vaše dete uzima ili je do nedavno uzimalo bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Uzimanje leka DORMIKIND sa hranom ili pićima

Lek DORMIKIND treba uzimati pola sata pre ili posle jela.

Primena leka DORMIKIND u periodu trudnoće i dojenja

Nije primenljivo. Lek je namenjen deci.

Uticaj leka DORMIKIND na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nije primenljivo. Lek je namenjen deci.

Važne informacije o nekim sastojcima leka DORMIKIND

U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka, jer se u njegovom sastavu nalazi laktoza.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DORMIKIND

Deca od 0 do 6 godina: uzeti 1 tabletu 4 puta na dan.

Tablete treba uzeti pola sata pre ili posle jela i pustiti da sa polako rastopi u ustima. Kod beba, tablete se mogu rastopiti u malo vode.

Ako ne dodje do poboljšanja ili se tegobe učestalo ponavljaju, pacijent treba da se obrati svom lekaru.

Ako ste uzeli više leka DORMIKIND nego što je trebalo

Do sada nisu zabeleženi slučajevi ozbiljnog predoziranja ovim lekom. Ukoliko se Vaše dete ne oseća dobro javite se Vašem lekaru.

Ako ste zaboravili da uzmete lek DORMIKIND

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

Ako naglo prestanete da uzimate lek DORMIKIND

Ukoliko naglo prestanete sa uzimanjem ovog leka ne očekuju se nikakvi negativni efekti.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Nema poznatih neželjenih dejstava izazvanih upotrebom homeopatskog leka DORMIKIND. Ukoliko posumnjate da Vaše dete ima neželjene posledice nakon primene ovog leka, javite se Vašem lekaru ili lekaru homeopati.

5. KAKO ČUVATI LEK DORMIKIND

Rok upotrebe

5 godina

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja boćice: 12 meseci

Čuvanje

Čuvati na temperaturi do 25 °C u originalnom pakovanju.

Čuvati van domaćaja i vidokruga dece!

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek DORMIKIND

1 tableta sadrži: Cypripedium pubescens D4 15 mg, Magnesium carbonicum D10 20 mg, Zincum valerianicum D12 15 mg.

Pomoćne supstance: Laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; talk; magnezijum-stearat.

Kako izgleda lek DORMIKIND i sadržaj pakovanja

Okrugle, ravne, fasetirane tablete bele boje.

U kutiji se nalazi bočica od smeđeg stakla tip III sa plastičnim zatvaračem od polietilena visoke gustine bele boje, sadrži 150 tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Alpen Pharma d.o.o.

Ilirska 5

11060 Beograd

Srbija

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostrasse 24
76227 Karlsruhe
Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust 2009

Režim izdavanja leka

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole

3248/2010/12 od 04.06.2010

